

有機大豆病蟲害防治曆

防治時期	防治對象	使用防治資材	稀釋 倍數(倍)	注意事項
新植整地期	根瘤線蟲	1. 每公頃施用蝦蟹殼製劑 3000 公斤 2. 與水田輪作		1. 施用後保持土壤微濕，14 天後再種植。
	切根蟲	種植前全園浸水以殺死土棲之卵、幼蟲及蛹。		
生育初期	雜草管理	穀殼鋪放於畦溝中、拔除。		
	根腐病			
	潛蠅類	懸掛黃色黏紙或水盤誘殺成蟲。		約 4 公尺懸掛一張，黏性降低時更換。
	黑豆蚜	1. 施用大蒜浸出液或苦楝油。 2. 懸掛黃色黏紙或水盤誘殺。		約 4 公尺懸掛一張，黏性降低時更換。
	小白紋毒蛾及台灣黃毒蛾	1. 蘇力菌	1000-1500 倍	黃昏噴施，每隔 10 天噴施一次。
		2. 隨時摘除卵塊		
	斜紋夜蛾	1. 蘇力菌	1000-1500 倍	黃昏噴施，每隔 10 天噴施一次。
2. 懸掛性費洛蒙誘蟲盒		離地 1-1.5 公尺，	斜紋夜蛾每公頃	

			每周清理一次、 1-2 月更新一次。	4-8 盒。
		3. 利用食物誘引法，將米糠、黑糖及蘇力菌混拌製誘餌誘殺夜盜蟲		
		4. 隨時摘除卵塊		
		5. 白殭菌或黑殭菌		
		6. 誘蛾燈		
	銀葉粉蝨	1. 施用大蒜浸出液或苦楝油。 2. 懸掛黃色黏紙		約 4 公尺懸掛一張，黏性降低時更換。
	露菌病			
	病毒病	拔除病株		
開花結莢採收期	斜紋夜蛾	同生育初期		
	黑豆蚜	同生育初期		
	薊馬類	1. 施用大蒜浸出液或苦楝油。 2. 懸掛藍色黏紙		約 4 公尺懸掛一張，黏性降低時更換。
	銀葉粉蝨	同生育初期		
	綠椿象	1. 懸掛黃色黏紙		
	葉蟻類	基徵草蛉或捕植蟻捕捉葉蟻		
	小綠葉蟬	1. 施用大蒜浸出液或苦楝油。 2. 懸掛黃色黏紙		約 4 公尺懸掛一張，黏性降低時

				更換。
	豆莢螟	1. 蘇力菌	1000-1500 倍	黃昏噴施，每隔 10 天噴施一次。
		2. 白殭菌或黑殭菌		
		3. 誘蛾燈		
	銹病	勿密植保持通風		
	白粉病	選種抗病品種		
	露菌病			
	紫斑病			
	病毒病	拔除病株		